

ÇOCUK İSTİSMARI ve İHMALİNİ ÖNLEME KONGRESİ 27-30.EYLÜL.2009

ANKARA

KAYSERİ DENEYİMLERİ

Yrd. Doç. Dr. Fatih YAĞMUR

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp AD ve Çocuk İstismarını Tedavi ve

Engelleme Merkezi (ÇİTEM)

Kısa mesafeden düşmenin en yaygın sebebi beşikten düşmelerdir. Bu düşmeler sonucu ya minör bir yaralanma olmakta ya da hiç yaralanma oluşmamaktadır. İntrakranial yaralanma, retinal kanama, kot kırıkları ve/veya çoklu hayatı tehdit eden bir yaralanma ile getirilen çocuklarda ayırıcı tanıda istismar göz önünde tutulmalıdır.

Hekimler çocuk istismarı olgularını atlamamak için; istismar ve ihmalin bulgu ve semptomlarını tanıyabilmeli, bunlara bağlı oluşan yaralanmalarda tıbbi değerlendirmeyi yapabilmeli, çocuğun daha fazla zarar görebileceği durumlarda gerekli acil önlemleri alabilmelidir. Risk altındaki çocuk hastaneye yatırılmalı ve acil bakım merkezlerine alınmalıdır.

Çocuk istismarı şüphesi olan olgular değerlendirilirken multidisipliner yaklaşım önem arz etmektedir. Bu amaçla hastaneler bünyesinde adli tıp uzmanı, sosyal pediatri uzmanı, çocuk psikiyatrisi uzmanı, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk istismarı konusunda eğitilmiş

hemşirelerden oluşacak çocuk koruma merkezleri oluşturularak olgular birimde çalışan ekip tarafından değerlendirilmelidir.

Çocuk koruma birimi olmayan yerlerde çalışan uzman hekimler veya pratisyen hekimlere kısa süreli çocuk istismarı ve ihmali konularında takviye eğitimler verilmelidir. Ayrıca tüm sağlık çalışanlarının gerekli durumlarda çocuk koruma birimi bulunan merkezler ile irtibat kurması ve buralardan destek almasına olanak sağlanmalıdır.