

Olgu İzlem Deneyimleri

Mehmet Akif İnanıcı



Tıp Fakültesi, Adli Tıp AD

Multidisipliner yaklaşım

- Konsültasyon sistemi
- Çocuk koruma (istismarı önleme) birimleri
- Çocuk koruma merkezleri

“... öğrenci, hekim ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik eğitim vermek ve bilinç yükseltme çalışmaları yapmak”

Olgu 1

- 10 yař, erkek çocuk
- Öksürük yakınması
- Anal bölgede hiperemik lezyonlar
- Anal sfinkter tonusunda azalma

Çocuk istismarı (fiili livata) düşünülmesi üzerine, çocuk cerrahisi ve çocuk psikiyatri konsültasyonu istendi

Olgu (birim deęerlendirmesi)

YAKINMASI

- Öksürük (Kaka yapamama) yakınması
- Oyun oynarken kakamı tutuyorum. Ben ayakta, kuzenim bir yeri sıkarak tutuyor
- Anne baba ayrı, bazen dede/büyükanne yanında kalıyor
- Okuldan geldikten sonra baba gelene kadar komşu bakıyor
- Komşununun 16-19 yaşında iki ođlu var
- Babanne (15 gündür yoğun olarak kakasını yapıyor. Kaka kaçırma yakınması.)
- Konuşması rahat, kendisini ifade edebiliyor, zeka normalin üstünde.
- Anne baba ayrı, anne şehir dışında, baba psikiyatrik rahatsızlığı var.

Olgu (birim deęerlendirmesi)

FİZİKSEL MUAYENE

- Haricen herhangi bir travmatik lezyon saptanmadı.
- Peri-anal bölgede kronik dermatite uyan 2-3 mm boyutlarında çok sayıda, dairesel olarak dizilmiş, epidermal lezyonlar saptandı.
- Ano-kutenael hatta ve anal mukozada özellik saptanmadı.
- Onamları alınarak fotoğraf çekildi.

Olgu (birim deęerlendirmesi)

- SONUÇ
- Fiili livatanın tıbbi delillerine rastlanmadığı.
- Anüs çevresinde saptanan lezyonların çocuęun kaka kaçırmasına başı olarak, bu bölgede kalan kanın ciltle teması sonucu cildi tahriş etmesi neticesi olduęu.

Çocuk psikiyatrisi takibine alındı.



Olgu 2 (*F. Yavuz*)

- 13 yaşında erkek çocuk
- Babası tarafından tecavüze uğradığını iddia etmektedir (Akmerkez otoparkında, dersten çağırıp okul bahçesinde).
- Anne baba (doktor) ayrılmak için mahkemeye başvurmuş.
- Birinci basamakta yapılan muayenesinde anüs çevresinde çepeçevre ekimoz, akut livata tanısı konmuş.
- ATK Kurul muayenesinde, anal venöz konjesyon tanısı almıştır.
- Anne psikiyatrik değerlendirmesi istenmiştir.

İngiltere 337 istismar muhtemel/kesin, Kuzey Amerika 267 istismar (-)

- Peri-anal eritem
- Fissür veya yırtıklar
- Refleks anal dilatasyon
- Venöz konjesyon

%42

Perianal eritem

Kötü hijyen

Fekal kirlenme

Liken sklerozis

Anal fissürler

Kabızlık

Diare

Ekzema

Liken sklerozis

Venöz distansiyon

Gluteal traksiyon ve dizlerin
bükülü olmasına bağlı

Refleks anal dilatasyon

Dikkatle yorumlanmalıdır.

Yanlış yorumlanan ano-genital bölgedeki rahatsızlıklar

- İyileşmiş bir yarayı ya da cinsel yolla bulaşan hastalıkları taklit edenler
 - Lichen sklerosus
 - Vulvar pemphigoid
 - Vaginal haemangiomas
 - Urethral polyps
 - Behcet's syndrome
 - Perianal streptococcal cellulitis
 - Konjenital anomaliler
- Crohn hastalığının perianal bulguları

Öneriler

- Eğitimlerin son derece dikkatli verilmesi
- Tek merkezde muayene (Multidisipliner yaklaşım)